

BUSCAR

Búsqueda avanzada

Bienvenido Sr. Sardinero

[Cambiar preferencias](#)

Jueves

27 de septiembre de 2007

[Secciones](#) [Especialidades](#) [Autonomías](#) [Archivo](#) [Especiales](#) [Documentos](#) [Multimedia](#) [MiDiariomedico](#) [Opinión y Participación](#) [Formación](#) [Servicios](#)[Diariomedico.com](#) > [Secciones](#)

NORMATIVA

Indemnizada una paciente tras sufrir una perforación al extirparle la vesícula



Una paciente recibirá 60.000 euros (diez millones de pesetas) por la perforación intestinal que sufrió tras una operación y las secuelas e intervenciones que ha padecido a consecuencia de ello.

N.S 17/11/2005

Así se desprende del acuerdo contencioso al que han llegado la compañía de seguros Zurich y Álvaro Sardinero, abogado de la paciente.

Los hechos se produjeron en junio de 2002 cuando la mujer fue ingresada para extirparle la vesícula debido a la presencia de cálculos. Como consecuencia de esta intervención se produjo una perforación intestinal que provocó la salida de contenido fecaloideo a la cavidad abdominal y, en consecuencia, una peritonitis y un posterior síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA) de carácter severo. Posteriormente se descubrió una fistula y diferentes colecciones purulentas intrabdominales que precisaron una nueva operación. En el mismo centro se le realizó una broncoscopia, que provocó una perforación bronco-pleural, lo que supuso un agravamiento aún mayor. La enferma fue trasladada a otro hospital con un pronóstico muy grave. Allí se la mantuvo en tratamiento con fármacos por la infección respiratoria y se le realizó una extirpación parcial del intestino, colocándole un ano contra natura o ileostomía.

La última operación

En diciembre de 2003, le efectuaron otra extirpación intestinal y una unión entre dos partes de intestino, colocándole una malla de polipropileno y cerrando también la ileostomía.

La situación clínica de la paciente mejoró, pero le han quedado secuelas estéticas severas. Además, ha permanecido varios meses impedida y ha quedado con una malla de prolene colocada en el abdomen, paresia de la musculatura de la pared abdominal, insuficiencia respiratoria leve y alteraciones peritoneales como consecuencia de las cirugías.

[Otras Especialidades](#)